

Prélèvement de sperme

Avant le prélèvement

Les analyses de sperme se font uniquement sur rendez-vous et sur le site de la Chaux-de-Fonds.

Les patients doivent prendre rendez-vous du lundi au vendredi par téléphone au +41 32 967 23 75.

→ Matin 09h – 10h

→ Après-midi 15h – 16h

Avant de vous rendre au laboratoire *admed* qui se situe au 3ème étage de l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds, nous vous prions de bien vouloir passer faire une «carte d'accueil» à la réception.

Le prélèvement peut se faire soit au laboratoire soit à domicile.

Prélèvement au laboratoire

→ Avant le prélèvement de sperme, une abstinence sexuelle de 2-4 jours est recommandée.



1. Après avoir uriné, se laver les mains et le pénis au savon. Bien rincer et essuyer avec une serviette ou du papier.
2. Ouvrir l'emballage stérile. Dévisser le bouchon bleu du tube et y adapter l'entonnoir.
3. Enlever le couvercle et éjaculer dans l'entonnoir. Attendre que tout l'éjaculat se soit écoulé dans le tube. Ceci peut prendre quelques minutes.
4. Tapoter directement le tube pour vider entièrement l'entonnoir.
5. Enlever et jeter l'entonnoir. Boucher hermétiquement le tube en vissant bien le bouchon bleu.
6. Donner le tube au laboratoire.



Prélèvement à domicile

→ Avant le prélèvement de sperme, une abstinence sexuelle de 2-4 jours est recommandée.

Des kits de prélèvement sont à votre disposition soit au laboratoire *admed* à la Chaux-de-Fonds, soit au laboratoire *admed* à Neuchâtel (site de Pourtalès).



1. Après avoir uriné, se laver les mains et le pénis au savon. Bien rincer et essuyer avec une serviette ou du papier.
2. Ouvrir l'emballage stérile. Dévisser le bouchon bleu du tube et y adapter l'entonnoir.
3. Enlever le couvercle et éjaculer dans l'entonnoir. Attendre que tout l'éjaculat se soit écoulé dans le tube. Ceci peut prendre quelques minutes.
4. Tapoter directement le tube pour vider entièrement l'entonnoir.
5. Enlever et jeter l'entonnoir. Boucher hermétiquement le tube en vissant bien le bouchon bleu.
6. Apporter le tube au laboratoire dans les 45 minutes qui suivent le prélèvement, en le mettant dans le protège-tube (bouchon bleu en bas et pointe en haut). Maintenir le tube à une température voisine de celle du corps (30-35°C), en le plaçant, par exemple, contre la peau ou dans une poche de pantalon.